

居家口服抗癌藥物 注意事項



 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號：(02) 28970011/(02) 66030011
預約掛號：(02) 28971177 網址：www.kfsyscc.org
癌症暨健康篩檢專線：(02) 28971133或(02) 28970011分機3205~8

前言

抗癌治療的選擇已趨多元，近來開發許多抗癌藥物，可居家服用，口服抗癌藥物的形式可能是錠劑，膠囊，或液體，與靜脈給藥途徑一樣具有細胞生物毒性，遵循安全防範措施是非常重要的。請注意以下事項，以保護您與家人的安全。

注意事項

- **領取藥物：**需仔細核對藥物的名稱、劑量及劑型是否正確。並清楚了解服藥頻率、服藥間隔及醫師與藥師的用藥指示。
- **儲存藥物：**應放置於有原標籤的容器或包裝中，並選擇乾燥陰涼或依特殊指示(如冰箱冷藏等)存放，且與食物與其它藥物分開儲存，避免兒童及寵物誤服。
- **備藥安全：**備藥者拿藥時，可使用手套、倒入小藥杯或以湯匙輔助，以避免皮膚直接接觸藥物；若不小心接觸到，請用肥皂及水清洗。懷孕或哺乳婦女應避免接觸抗癌藥物。
- **服藥方式：**口服抗癌藥物錠劑或膠囊建議完整吞服使用，請勿咀嚼、剝半、壓碎、磨粉或打開膠囊，或依藥師建議方式服用。不當使用可能會增加藥物暴露的風險或改變藥物的吸收。

- **服藥禁忌：**請以白開水服藥，或按照個別藥物特殊指示服用。若您有正在服用的藥物或健康食品請先告知您的醫師或藥師。
- **按時服藥：**如果錯過服藥時間，劑量錯誤或服藥不當，可能影響治療效果，請諮詢腫瘤照護團隊是否需補服藥物。
- **嘔吐或腹瀉時：**若服藥後短時間內出現嘔吐或腹瀉時，可能影響藥物吸收，請與醫師討論是否需補服藥物。
- **居家排泄物處理：**服用化療藥物的期間直到停藥後的 5-7 天內，體液(例如：尿液或嘔吐物)存有少量的成分，可能傷害或刺激皮膚，建議如廁後放下馬桶蓋後沖水兩次，若由照護者協助處理排泄物，務必帶上手套處理。
- **廢棄藥物處理：**不需使用的藥物請交還醫院藥劑科處理，切勿沖入馬桶或隨意扔棄。
- **副作用：**發生率及嚴重程度，會因所使用的藥物、劑量與個人體質而不同；進行治療前，應充分了解藥物可能導致的副作用與注意事項。任何可能與藥物相關的副作用請於回診時告知醫師，若產生嚴重副作用時應立即就醫。

- **定期回診：**請依照醫師指示回診、定期檢查，並詳細告知醫師身體狀況，以提供醫師擬定治療計畫、評估藥物副作用，進而做適當處置。

結論

希望您在醫療團隊細心指導下，能確實了解口服抗癌藥物注意事項，遵照醫囑正確服藥，順利完成抗癌治療療程！

個人筆記

- 您此次服用的藥物名稱是

- 您服用的藥物主要副作用為

自我照護 201606 制定
護理部 病人與家屬教育小組

交通指南

一、捷運：淡水線捷運

忠義站下車：5-10 分鐘步行即到醫院

關渡站下車：免費接駁車每 20 分鐘行駛一班次

- ◎ 接駁車站牌在和信醫院正門口及關渡捷運站門口牌處
- ◎ 週六下午及醫院休診日不行駛
- ◎ **班次時間表請參閱 ”和信治癌中心醫院與您” 雙週刊或網路查詢**

二、公車

公車如走中央北路則在「和信醫院」站牌下車；
公車如走大度路則在「大度立德路口」站牌下車。

- ◎ 大南客運：223、302、小 23
- ◎ 指南客運：308 (竹圍-台北車站)、淡大-北門、淡海-北門
- ◎ 淡水客運：632 (八里-北投)、三芝-台北

